

ACIDAL Lactic

Sypki zakwaszacz do pasz dla drobiu.



ACIODAL LACTIC jest sypką formą kwasu mlekowego, który neutralizuje bakterie zawarte w paszy i przeciwdziała powtórnemu skażeniu mikrobiologicznemu. Preparat ten wspomaga naturalną fermentację i uzupełnia niedobory produkcji kwasu mlekowego w wolu młodych ptaków.

W pracy hodowlanej uzyskano bardzo duże postępy w zakresie przyspieszania tempa wzrostu drobiu. Za wzrostem tym nie nadążają jednak symbiotyczne bakterie bytujące w wolu ptaków. Dlatego też u młodych brojlerów naturalna fermentacja w wolu nie jest dostatecznie rozwinięta, a bakterie *Lactobacilus* produkujące kwas mlekowy nie są w stanie stworzyć optymalnego środowiska do unieszkodliwiania mikroorganizmów pochodzących z paszy. Niemożliwe jest zatem stworzenie skutecznej bariery przeciw bakteriom, takim jak *Salmonella* czy *E. coli*. Bakterie te nie zawsze doprowadzają do choroby, ale nawet podkliniczne zakażenia tymi mikroorganizmami hamują naturalną fermentację w wolu, obniżając wzrost ptaków.

ACIDAL LACTIC jest bardzo pomocny w przezwyciężaniu tych problemów. Produkt ten jest stworzony po to, aby nie dopuszczać do rozwoju bakterii antagonistycznych, takich jak *Salmonella* czy *E. coli*, mających niekorzystny wpływ na bakterie *Lactobacilus*.

Odmienność zakwaszaczy dla drobiu w stosunku do zakwaszaczy stosowanych w żywieniu prosiąt polega na tym, że mają one wspomagać naturalną fermentację w wolu ptaków, a nie uzupełniać produkcję kwasu solnego w żołądku.

Skład:

ACIDAL LACTIC jest mieszaniną kwasów mlekowego (55-60%) i mrówkowego (10-12%) na nośniku krzemionkowym.

Działanie:

Ze względu na zawartość kwasów organicznych **ACIDAL LACTIC** zmniejsza właściwości buforowe paszy i powoduje obniżenie pH w wolu ptaków. **ACIDAL LACTIC** posiada także specyficzne właściwości przechodzenia przez błony komórkowe bakterii i ich zabijania. Dzięki tym właściwościom pH w wolu nie musi być obniżane aż do pH 3 (wystarczy pH 5). Badania wykazały także, że kwas mlekowy doskonale współdziała z antybiotykami paszowymi, polepszając wskaźniki produkcyjne brojlerów.

Efekty stosowania:



ACIDAL LACTIC

Przeciwdziała namnażaniu patogenów w paszy i w wolu (np. *E. coli*, *Salmonella*)



ACIDAL LACTIC

Stymuluje rozwój korzystnej mikroflory w wolu (*Lactobacillus*)



ACIDAL LACTIC

Usprawnia koagulację i trawienie białka



ACIDAL LACTIC

Zwiększa przyrosty i wykorzystanie paszy



ACIDAL LACTIC

Redukuje biegunki i upadki ptaków.

Dawkowanie:

Dawkowanie preparatu **ACIDAL LACTIC** zależy od właściwości buforujących paszy.



ACIDAL LACTIC

2 kg/tonę paszy – dawka minimalna



ACIDAL LACTIC

3-4 kg/tonę paszy – dawka zalecana



ACIDAL LACTIC

10 kg/tonę paszy – dawka maksymalna

Opakowania:

Worki 25 kg